

ŠKRLATINKA

Škrlatinka je zelo nalezljiva otroška bolezen. Bolezen povzroča *Streptococcus pyogenes*, (β hemolitični streptokoki skupine A).

- Običajen čas od okužbe do pojava bolezni je **1 – 3 dni**.
- Bolan otrok je kužen od začetka pojava bolezenskih znakov do 24 ur po učinkovitem zdravljenju z antibiotiki.

Bolezni znaki:

- **Vneto žrelo** je močno rdeče, nebnice so povečane in vnete, pogosto pokrite z belkasto rumenimi oblogami.
- **Povišana telesna temperatura** (običajno višja od 38,5 ° C).
- **Splošna utrujenost**, glavobol, slabost, bruhanje.
- **Povečane in otekle vratne bezgavke**.
- **Rdeč obraz**, le trikotnik med konico nosu in brado je bled (Filatovljev trikotnik).
- **malinast jezik**, ki je najprej belo obložen. Drugi ali tretji dan bolezni se začne luščiti od spredaj nazaj in postane gladek in živordeč. Papile na jeziku postanejo dobro vidne in štrlijo navzgor.
- **Značilen izpuščaj** se pojavi 12-48 ur po prvih simptomih - najprej na trebuhu in prsih, kasneje pa se razširi po vratu, rokah in nogah. Najbolj je viden v zgibih in kožnih gubah (pod pazduho, na komolcu, pod vratom). Izpuščaja ni nikoli po obrazu.

Izpuščaj sestavljajo zelo goste drobne rdeče pikice, dvignjene nad površino kože, ki dobi teksturo grobega brusnega papirja. Približno teden dni po izpuščaju se začne koža luščiti – najprej na vratu in trebuhu, približno v tretjem tednu pa se začne luščiti v večjih kosih še po ekstremitetah (dlani, stopala).

- Škrlatinka se širi s kužnimi kapljicami (kašljanjem, kihanjem zbolelega) ali z neposrednim stikom z okuženo osebo.
- Redko je možen tudi posreden prenos preko okuženih predmetov.

Otroci, ki imajo škrlatinko, ne smejo v vrtec dokler ne mine 24 ur od začetka jemanja antibiotikov, razen če zdravnik ne določi drugače.

Prosimo, da morebitna opažanja v zvezi z obolenjem pravočasno sporočite vzgojiteljicam skupine, ki jo obiskuje vaš otrok.